

GIARDIASIS

Darmziekte die veel honden in (sub)tropische gebieden - maar ook in de Verenigde Staten - onder de leden hebben. Alleen voor verzwakte dieren echt gevaarlijk. De parasiet verspreidt zich via het oppervlaktewater.

Besmetting

In veel delen van de wereld is giardiasis waarschijnlijk de belangrijkste maar minst vaak herkende darmziekte bij honden en katten. In een Amerikaans onderzoek bleek 90% van de onderzochte honden ermee besmet te zijn. Maar ook bij wilde dieren en mensen komt de besmetting voor.

Giardia lamblia is een eencellige die huist in het bovenste gedeelte van de dunne darm. De parasiet komt, ingekapseld in een cyste, via de ontlasting van het dier veelvuldig terecht in het oppervlaktewater. De cystes kunnen daar, afhankelijk van de omstandigheden, 2 tot 3 maanden overleven. Wanneer een hond besmette ontlasting eet of besmet water drinkt - dat er overigens meestal schoon uitziet en fris *ruikt* - krijgt hij de cystes binnen. In de dunne darm van hun nieuwe gastheer 'ontkapselen' ze zich en worden weer beweeglijk en actief.

Symptomen

Giardiasis is in het algemeen niet heel gevaarlijk en de meeste honden hebben na een besmetting nergens last van, maar enkele worden ergens tussen de 2 en 14 dagen na besmetting wel ziek. Aanhoudende diarree is het meest opvallende symptoom. De ontlasting is zacht, licht van kleur, vettig en slijmerig en stinkt erg. De diarree kan met tussenpozen optreden of weken tot maanden achtereen aanhouden. Soms is er sprake van koorts, overgeven, buikkrampen en van gewichtsverlies, maar veel honden hebben geen last van verminderde eetlust en eten goed. Sommige honden bouwen op den duur een zekere immuniteit op, maar bij honden met een verminderde weerstand kan de ziekte fataal zijn.